



ایوی توس®

شکل دارویی: شربت ۱۲۰ میلی لیتری

ترکیب دارویی:

۱۰۰ میلی لیتر شربت حاوی ۲ گرم عصاره مایع اتانولی ۷۰٪ برگ گیاه عشقه (بیچک) *Hedera helix* معادل ۴۰ میلی گرم هدراکوزید سی می باشد.

مواد مؤثره:

برگ گیاه عشقه محتوی ترکیبات مؤثره شامل ساپونین های تری تریپن (اگلیکون هدرازنین، هدراکوزید سی)، استروئیدها (بتاسیتوسترول، کامپستترول)، فالکارینول و فلاونوئیدها می باشد.

فارماکولوژی:

اثر درمانی این دارو در رفع علائم برونشیت و سرفه مربوط به ترکیبات مؤثره از جمله سایونین های تری تریپن می باشد. این ترکیبات با کاهش اسپاسم و نیز با دارا بودن خاصیت اکسپکتورانت با افزایش حجم خلط، غشا موکوسی را از آسیبها محافظت نموده و در بهبود برونشیت و التهابات مجاری تنفسی مؤثرند. همچنین ترکیبات این فرآورده دارای فعالیتهای آنتی باکتریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی می باشد که در مطالعات فارماکولوژیک متعدد تأیید قرار گرفته است.

در سال ۲۰۰۶ در یک مطالعه بزرگ بر روی ۹۶۵۷ بیمار مبتلا به برونشیت حاد یا مزمن تجویز شربت محتوی عصاره برگ خشک عشقه به مدت ۷ روز باعث بهبود علائم برونشیت در ۹۵٪ بیماران گردید. میزان بروز عوارض جانبی در این مطالعه ۲/۱٪ بود که ۱/۵٪ از این میزان عوارض گوارشی بود.

موارد مصرف:

بهبود علائم بیماریهای التهابی مزمن برونش، تسکین دهنده سرفه همراه با التهاب حاد دستگاه تنفسی

موارد منع مصرف:

- حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- موارد عدم تحمل فروکتوز

احتیاطات:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- در صورت ابتلا به زخم معده
- در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای ضد سرفه و اکسپکتورانت
- مصرف این دارو در نوزادان زیر یک سال و کودکان حتماً با نظر پزشک باشد. دوز توصیه شده این دارو در کودکان با دقت انجام شود.

بارداری و شیردهی:

ایمنی مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی بررسی نشده است.

مقدار مصرف:

- کودکان ۲-۳ سال: ۳ بار در روز هر بار ۲/۵ میلی لیتر
- کودکان ۴-۱۴ سال: ۲ بار در روز هر بار ۵ میلی لیتر
- افراد بالای ۱۵ سال: ۳ بار در روز هر بار ۵ میلی لیتر
- قبل از مصرف ظرف را تکان دهید.

عوارض جانبی:

در موارد نادر ممکن است باعث عوارض گوارشی و اسهال شود.

تداخلات دارویی:

شناخته نشده است.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نماید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.

