

## کلیندامین®

کلیندامایسین (به صورت پالمیتات هیدروکلراید)  
۷۵ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

**این دارو جهت بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.**  
فروش بدون نسخه ی پزشک ممنوع است.

### راهنمایی های عمومی و هشدارها:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه ی حساسیت به کلیندامایسین، لینکومایسین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده ی محافظ و ماده ی رنگی
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری خصوصا بیماری شدید تا متوسط کبدی و کلیوی
- در صورت ابتلا به بیماری التهابی روده ی بزرگ و یا بیماری کولیت
- در صورت سابقه ی بروز اسهال متعاقب مصرف آنتی بیوتیک ها
- در صورت ابتلا به نقص آنزیم گلوکز ۶-دهیدروژناز
- در صورت مصرف هر نوع دارو
- مصرف دارو را بدون مشورت پزشک قطع ننمائید.
- همزمان با مصرف این دارو از مصرف داروهای دیگر بدون تجویز پزشک خودداری نمائید.

### مقدار و نحوه ی مصرف:

مقدار مصرف این دارو را پزشک برای بیمار تعیین می کند.

### عوارض جانبی:

- عوارضی که در صورت بروز، نیاز به قطع دارو و مراجعه ی سریع به پزشک دارد:
- علائم کولیت سودوممبران شامل: دل درد شدید، سفتی شکم، اسهال شدید آبکی که در مواقعی می تواند خون هم باشد، واکنش های آلرژیک با علائمی مانند تورم چشم، دهان، گلو، دشواری در تنفس، تاول زدن یا لایه لایه شدن پوست، بثورات جلدی و خارش شدید، نوتروپنی یا علائم ظاهری تب و گلودرد، ترومبوسیتوپنی یا علامت ظاهری خونریزی و خون مردگی یا کیودی زیرپوستی
- عوارضی که در صورت تداوم نیاز به قطع دارو و مراجعه ی سریع به پزشک دارد:
- اسهال، شکم درد، حالت تهوع و استفراغ به صورت مداوم یا شدید که می تواند حاکی از ایجاد عفونت توسط کلستریدیوم دیفیسیل باشد، خارش در نواحی تناسلی و مقعد

### تداخلات دارویی:

کلیندامایسین پالمیتات هیدروکلراید با داروهای ریفامپین، شل کننده های عضلانی، داروهای بیماری میاستنی گراویس، داروهای بیهوشی، آمینوگلی کوزیدها (جتتامایسین، اریترومایسین، آزیترومایسین)، کلرامفنیکل، پریماکین و St-John's wort (Hypericum perforatum) تداخل دارد.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات نشان می دهد که کلیندامایسین پالمیتات هیدروکلراید از جفت عبور کرده و در شیر مادر ترشح می شود، فلذا در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید قبل از مصرف این دارو حتما با پزشک خود مشورت نمایید. همچنین به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی جدی در شیرخواران، کلیندامایسین نباید توسط مادران شیرده مصرف شود.

### روش آماده سازی:

- در بسته بندی اصلی دارو یک ساشه حاوی پودر دارویی و یک حلال وجود دارد، جهت آماده سازی محلول ابتدا محتوای ساشه را درون شیشه حاوی حلال آماده بریزید و ۳۰-۱۵ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات پودری به طور یکنواخت درحلال پخش شوند.
- قبل از هر بار مصرف، محلول آماده شده را ۱۰-۵ ثانیه تکان دهید.
- به منظور اندازه گیری حجم دقیق فرآورده از سرنگ داخل جعبه استفاده نمائید و قبل از هر بار مصرف داخل و خارج سرنگ را بشوید.

### شرایط نگهداری:

- قبل از آماده سازی محلول، حلال و ساشه حاوی دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.
- بعد از آماده سازی محلول را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.
- دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمائید.
- پس از آماده سازی فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن بایستی دور ریخته شود.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



شرکت داروسازی امین  
ایران - اهواز

