

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

## راهنمایهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سابقه حساسیت به فکسوفنادین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله نارسایی کلیوی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله اریتروماسین، کنتوکنازول و آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم یا منیزیم.

## مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر با صلاحدید پزشک.

## هشدارها :

- دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف نماند ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه، تنظیم دوز دارو توسط پزشک لازم است.
- این دارو را همراه آب میل کنید.
- از مصرف دارو با آبمیوه خودداری ننمایید.
- از مصرف همزمان آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم با این دارو خودداری ننمایید.

## مقدار و نحوه مصرف :

- مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید.
- قبل از هر بار مصرف ظرف محتوی دارو را خوب تکان دهید.

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمیافتند، لیکن در صورت بروز هر کدام با پزشک خود مشورت کنید. عوارضی که در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی دارند:

نادر: تنگی نفس، کوتاه شدن تنفس، احساس گرما، قرمزی صورت، گردن، بازوها و گاهاً بالای قفسه سینه، تورم شبیه کهیر در صورت، پلک، لبها، زبان، گلو، دستها، پاها و اعضای تناسلی.

عوارضی که در صورت تداوم یا ایجاد ناراحتی نیاز به توجه پزشکی دارند :

با شیوع کمتر و نادر: سرخه، سرگیجه، خواب آلودگی، درد در ناحیه پشت، قاعدگی دردناک، ناراحتی معده، ضعف و خستگی غیر معمول، تب، سر درد، درد مفاصل، تهوع، صدای زنگ در گوش، عفونت قسمت های فوقانی دستگاه تنفس، عفونت ویروسی، حالت عصبی، راش و اختلالات خواب.

## مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه شود.

## شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بیخ زندگی محافظت ننمایند.
- دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

