

لوسید امین[®]

فاموتیدین

هر ۱ میلی لیتر حاوی: فاموتیدین ۸ میلی گرم

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در مورد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به فاموتیدین، سابتیدین، رانیتیدین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

در صورت ابتلا به هر نوع بیماری خصوصاً سابقه بیماری شدید یا متوسط کلیوی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: این دارو از جفت عبور می کند اما مصرف آن در دوران بارداری در صورتی که با نظر پزشک باشد مجاز است.

شیردهی: این دارو در شیر ترشح می شود اما مطالعات کافی و تحت کنترل جهت بررسی اثر منفی آن بر شیرخوار موجود نمی باشد، بنابر این در صورت نیاز به مصرف در دوران شیردهی حتماً با پزشک مشورت نمایید.

هشدارها:

- دوره درمان با این دارو را کامل کنید و هرگز مقدار کمتر یا بیشتر از میزان تجویز شده استفاده نکنید.

- این دارو می تواند همراه غذا و یا به تنهایی مصرف گردد در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، دارو را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- فاموتیدین به علت مکانیسم اثر قلبیایی کننده خود می تواند فراموشی زیستی دروهایی مانند قرصهای روکش دار مقاوم به اسید معده و نیز دروهای حساس به اسید معده را تحت تأثیر قرار دهد.

- برای کنترل مشکلات گوارشی تجویز همزمان آنتی اسیدها با فاموتیدین توسط پزشک ممکن است صورت پذیرد اما بهتر است از مصرف فرآورده های آنتی اسید ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از مصرف فاموتیدین خودداری نمایید.

- مصرف همزمان فاموتیدین با دروهای ضد قارچ پتراکونازول، کتوکونازول و فلوکونازول جذب آنها را کاهش می دهد، لذا توصیه می شود فاموتیدین حداقل ۲ ساعت بعد از دروهای ضد قارچ ذکر شده مصرف گردد.

- مصرف فاموتیدین می تواند باعث افزایش کالپ سطح سرمی ترانس آمینازها در تست های آزمایشگاهی شود.

- در صورت مصرف طولانی مدت فاموتیدین باستی سطح ویتامین B۱۲ در بدن پایش شود، چرا که مصرف طولانی مدت فاموتیدین می تواند در برخی از افراد منجر به کاهش ترشح فاکتور داخلی جذب ویتامین B۱۲ شود.

- مصرف همزمان فاموتیدین با تیزانیدین به علت احتمال افت فشار خون، برای کاردی یا خواب آلودگی شدید توصیه نمی شود.

- اگر چه هیچ گونه عارضه اختصاصی برای سالمندان عادی متعاقب مصرف فاموتیدین گزارش نشده است، اما در سالمندان دچار نارسایی کلیه یا کبد، گیجی و عدم تمرکز، بی قراری، آشفتگی و توهم در زمان مصرف این دارو مشاهده شده است. لذا همواره در خصوص عوارض فوق الذکر در سالمندان مصرف کننده فاموتیدین دقت کافی را داشته باشید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید.

عوارض جانبی:

- عوارضی که شایع نیستند اما در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی سریع دارند:

آریتمی قلبی، حالت گیجی، سوزش معده، تنگی نفس، خستگی، ضعف غیر عادی، وکنش های پوستی، مثل خارش غیر عادی پوست، خون ریزی در گوشه لب ها، تب، لوکوپنی، نوتروپنی، درد عضلات و مفاصل، گلو درد.

- عوارضی که کمتر اتفاق می افتند اما در صورت طولانی شدن و استمرار نیاز به توجهات پزشکی دارند:

کاهش تمایل و توانایی جنسی، اسهال، درد و تورم سینه ها، سر درد، خواب آلودگی، درد شکم، ریزش مو، بی اشتها، بیوست، خشکی دهان و پوست، بی خوابی، تهوع، استفراغ، زنگ زدن گوش.

روش آماده سازی:

- در بسته بندی اصلی دارو، یک ساشه حاوی پودر دارویی و یک حلال وجود دارد. جهت آماده سازی سوسپانسیون، ابتدا محتوای ساشه را درون شیشه حاوی حلال آماده بریزید و ۳۰ - ۱۵ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات پودری به طور یکنواخت درحلال پخش شوند و یک سوسپانسیون یکنواخت به دست آید.

- قبل از هر بار مصرف، محلول آماده شده را ۱۰ - ۵ ثانیه تکان داده و پس از حصول سوسپانسیون یکنواخت مصرف نمایید

- به منظور اندازه گیری حجم دقیق فرآورده، از سرنگ داخل جعبه استفاده نمایید و قبل از هر بار مصرف داخل و خارج سرنگ را بشویید.

شرایط نگهداری:

- قبل از آماده سازی سوسپانسیون، حلال و ساشه حاوی دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- بعد از آماده سازی، سوسپانسیون را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- پس از آماده سازی، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن باید دور ریخته شود.

