

موتیلامین® ۵

دومپریدون (به صورت مالئات)

۵ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از توصیه مصرف آن به سایر افراد خودداری نمائید.
فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

راهنماییهای عمومی و هشدارها:

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سابقه حساسیت به دومپریدون و یا هر گونه دارو، ماده جانی، رنگ یا مواد محافظ
- در صورت سابقه ابتلا به تومورهای غده هیپوفیز
- در صورت سابقه پارگی یا انسداد روده
- در صورت مدفوع قیرگون (مدفوع بسیار تیره) و یا مشاهده خون در مدفوع
- در صورت سابقه بیماری کلیوی یا کبدی
- در صورت سابقه به Prolonged QT و یا هر گونه نارسای قلبی
- این دارو می تواند ریسک ابتلا به اختلالات ریتمی قلب را افزایش دهد، این عارضه در افراد بالای ۶۰ سال و با مقدار بالاتر از ۳۰ میلی گرم در روز می تواند با شدت بیشتری رخ دهد. این ریسک در صورت همزمانی مصرف این دارو با داروهای ضد عفونت باکتریایی و قارچی و یا در صورت ابتلا به بیماری AIDS/HIV بیشتر است.
- این دارو بایستی در بائین ترین دوز مؤثر مورد مصرف قرار گیرد.
- در صورتی که در زمان مصرف این دارو با عارضه تپش قلب، تنگی نفس و عدم تمرکز مواجه بودید، مصرف این دارو باید متوقف شود.
- مصرف دارو را بدون مشورت پزشک قطع نمائید.
- همزمان با مصرف این دارو از مصرف داروهای دیگر بدون تجویز پزشک خودداری نمائید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف این دارو را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانی:

- عوارضی که در صورت بروز بایستی مصرف دارو در اسرع وقت قطع و به پزشک مراجعه شود:
- تورم دستها و پاها، گردن، لپها، گلو و مشکل در تنفس یا بلع، خارش پوست، حرکت غیر طبیعی در چشم، زبان، حرکت غیر طبیعی گردن و گرفتن ماهیچه ها، تپش قلب غیر طبیعی و بروز تشنج
- عوارض عمومی که در صورت تداوم نیاز به مراجعه به پزشک دارد:
- خشکی دهان، افت میل جنسی در مردان، اضطراب و تحریک پذیری، خواب آلودگی، سر درد، اسهال، خارش پوست، ترشح غیر طبیعی شیر در زن و مرد، سفتی سینه ها، احساس ضعف، احساس اضطراب و تحریک پذیری

تداخلات دارویی:

- دومپریدون با داروهای ضد قارچ از زولپی مانند کنوکنازول، فلوکونازول و ورینوکنازول و داروهای ضد باکتری مانند اریتروماکسیسین، کلاریتروماکسیسین و داروهای ضد فشار خون و بیماری های قلبی مانند آمیودارون، سوتالول، دلتیازم، وراپامیل و داروهای ضد سایکوز و ضد آسردگی مانند هالوپریدول، پیموزاید، سیتالوپرام و اس سیتالوپرام و داروی سیزاپراید تداخل دارد.
- در صورت مصرف آنتی اسیدها (داروهای مانند سامیتیدین، فاموتیدین یا سدیم بی کربنات)، بین مصرف آنها و دومپریدون بایستی ۲ ساعت فاصله باشد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

روش آماده سازی:

- در بسته بندی اصلی دارو یک ساشه حاوی پودر دارویی و یک حلال وجود دارد، جهت آماده سازی سوسپانسیون ابتدا محتوای ساشه را درون شیشه حاوی حلال آماده بریزید و ۳۰-۱۵ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات پودری به طور یکنواخت در حلال پخش شوند و یک سوسپانسیون یکنواخت به دست آید.
- قبل از هر بار مصرف، محلول آماده شده را ۱۰-۵ ثانیه تکان داده و پس از حصول سوسپانسیون یکنواخت مصرف نمائید.
- به منظور اندازه گیری حجم دقیق فرآورده از سرنگ داخل جبهه استفاده نمائید و قبل از هر بار مصرف داخل و خارج سرنگ را بشویید.

شرایط نگهداری:

- قبل و بعد از آماده سازی سوسپانسیون، دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.
- دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمائید.
- پس از آماده سازی، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن بایستی دور ریخته شود.

