

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ی مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

موارد مصرف:

- برای درمان تیخال و سایر عفونت‌های ویروسی ناشی از ویروس هرپس (واریسلا زوستر) مانند آبله مرغان و زونا.
- برای جلوگیری از حملات مکرر هرپس سیمپلکس.
- برای کمک به جلوگیری از ابتلا به عفونت‌های تیخال در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند.

راهنمایی‌های عمومی و هشدارها:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

- در صورت حساسیت به آسیکلوویر، والاسیکلوویر یا هر نوع ماده دارویی، ماده محافظ یا ماده رنگی.
- در صورت ابتلا به بیماری‌های کبدی و بیماری‌های کلیوی.
- در صورت مصرف هرگونه دارو.
- دوره‌ی درمان با این دارو را کامل کنید.
- سوسپانسیون آماده شده را قبل از هر بار مصرف خوب تکان دهید.
- دارو را با آب میل کنید.
- در طول مصرف مایعات زیادی بنوشید.
- در سالمندان ممکن است پزشک دوز مصرفی را برای کاهش خطر عوارض جانبی کاهش دهد.
- در زمان مصرف این دارو مقدار زیادی مایعات مانند آب بنوشید.
- دوره درمان را کامل نمایید.
- دارو را حتی در صورت احساس بهبودی بدون تجویز پزشک قطع ننمایید.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد.

عوارض جانبی:

- هر داروی به موازات اثر درمانی می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی‌افتد، لیکن در صورت بروز هر یک از موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- واکنش‌های آلرژیک مانند: بثورات پوستی، پوسته پوسته شدن پوست، جوش یا درد لب و دهان، تورم صورت، لب‌ها، زبان، گلو یا مشکل در تنفس یا بلعیدن، خس خس سینه، بال زدن یا سفت شدن قفسه سینه یا افتادگی ناگهانی، سردرد، سرگیجه، اسهال، معده درد، خارش، احساس خستگی زیاد، تب، گلودرد، زخم دهان و خستگی غیر عادی، آشفته‌گی، حالات مشابه توهم، خواب‌آلودگی و از دست دادن هوشیاری.

تداخلات دارویی:

آسیکلوویر می‌تواند با داروهای زیر تداخل داشته باشد:

پروپونیسید، سالیسیلیدین، مایکونازول،

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

روش آماده سازی:

- در بسته بندی اصلی دارو، یک سانه حاوی پودر دارویی و یک حلال وجود دارد. جهت آماده سازی سوسپانسیون، ابتدا محتوای سانه را درون شیشه حاوی حلال آماده بریزید و ۳۰-۱۵ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات پودری به طور یکنواخت در حلال پخش شوند و یک سوسپانسیون یکنواخت به دست آید.
- قبل از هر بار مصرف، محلول آماده شده را ۱۰-۵ ثانیه تکان داده و پس از حصول سوسپانسیون یکنواخت مصرف نمایید.
- به منظور اندازه گیری حجم دقیق فرآورده، از سرنگ داخل جعبه استفاده نمایید و قبل از هر بار مصرف داخل و خارج سرنگ را بشویید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

- پس از آماده سازی، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می‌باشد و پس از آن بایستی دور ریخته شود.

