

کاپتوپریل ۵

محلول خوراکی

هر ۵ میلی لیتر حاوی ۵ میلی گرم کاپتوپریل

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در مورد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت سابقه حساسیت به کاپتوپریل و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به نوع بیماری از جمله نارسایی کبدی و کلیوی، تنگی شریان کلیه، پیوند کلیه، بیماری قلبی عروقی، دیابت ملیتوس، زیادی پتاسیم خون، سابقه آنژیوادم و بیماران تحت دیالیز یا رژیم غذایی کم نمک.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای مدر، داروهای حاوی پتاسیم یا مکمل های پتاسیم، جایگزین های نمک، ضد اسیدها، لکل و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی خصوصاً ایندومتاسین.

هشدارها :

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمائید.

- برای عملکرد بهتر، دارو را با معده خالی و یک ساعت قبل از غذا مصرف کنید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را مصرف نمائید ولی اگر تقریباً نصف زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن صرف نظر کرده و مقدر مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- این دارو بر فشاری خون را درمان نمی کند بلکه آن را کنترل میکند از این رو ادامه مصرف دارو ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.

- دارو را حتی در مواقعی که احساس بهبودی می نمائید، مصرف کنید زیرا ممکن است علائم زیادی فشار خون باز نباشند.

- در صورت مصرف این دارو برای فشار خون بالا، ممکن است رعایت رژیم غذایی، محدودیت مصرف نمک و کنترل وزن لازم باشد.

- دارو را هر روز در وقت معین مصرف کنید.

- در صورت نیاز به عمل جراحی پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمائید.

- مصرف دارو را بدون تجویز پزشک قطع نمائید.

- همزمان با مصرف این دارو از مصرف داروهای دیگر بدون تجویز پزشک خودداری نمائید.

- برای جلوگیری از بروز دهیدراسیون در صورت تهوع، استفراغ یا اسهال شدید و تداوم این علائم به پزشک مراجعه نمائید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه گردد، لذا ضمن درمان از رتندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

- در صورت بروز علائم عفونت (مانند لرز، تب یا گلو درد) و یا علائم زردی (مانند زردی چشم ها یا پوست) به پزشک مراجعه نمائید.

- قبل از انجام تست های آزمایشگاهی در صورت مصرف کاپتوپریل پزشک معالج را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موزت اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت بروز هر کدام با پزشک خود مشورت کنید.

• عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

با شیوع کمتر: افت فشار خون (سرگیجه، سبکی سر، غش)، راش پوستی همراه با بدن خارش، تب یا درد مفاصل.

نادر: تورم صورت، دستها یا پاها، اشکال در بلع یا تنفس، درد معده، درد شکم، درد قفسه سینه، علائم افزایش پتاسیم خون (آشفتگی، ضربان قلب نامنظم، عصبی شدن، بی حسی یا گزگز دست ها، پاها یا لبها، کوتاه شدن و یا اشکال در تنفس، ضعف و یا سستی پاها).

• عوارضی که در صورت تداوم یا ایجاد ناراحتی نیاز به توجه پزشکی دارند :

شایع: سرفه خشک و مداوم، سر درد.

با شیوع کمتر: اسهال، تهوع، اختلال در حس چشایی، خستگی غیر معمول.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است مگر به تشخیص پزشک متخصص.

مصرف این دارو در دوران شیر دهی توصیه نمی شود. مگر به تشخیص پزشک متخصص.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه شود.

