

کاپتوپریل ۲۵

محلول خوراکی

هر ۵ میلی لیتر حاوی ۲۵ میلی گرم کاپتوپریل

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری ننمایید.

راهنمایی های عمومی :

- قبل از مصرف این دارو، در مورد زیر با پزشک خود مشورت کنید :
- در صورت سابقه حساسیت به کاپتوپریل و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله نارسایی کبدی و کلیوی، تنگی شریان کلیه، پیوند کلیه، بیماری قلبی عروقی، دیابت ملیتوس، زیادی پتاسیم خون، سابقه آنژیوادم و بیماران تحت دیالیز یا رژیم غذایی کم نمک.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای مدر، داروهای حاوی پتاسیم یا مکمل های پتاسیم، جایگزین های نمک، ضد اسیدها، الکل و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی خصوصاً ایندومتاسین.

هشدارها :

- درو را طبق دستور پزشک مصرف ننمایید.
- برای عملکرد بهتر، درو را با معده خالی و یک ساعت قبل از غذا مصرف کنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن درو را مصرف ننمایید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- این دارو پر فشاری خون را درمان نمی کند بلکه آن را کنترل میکند از این رو دامه مصرف درو ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.
- درو را حتی در مواقعی که حساس بهبودی می نمائید، مصرف کنید زیرا ممکن است علائم زیادی فشار خون بارز نباشند.
- در صورت مصرف این دارو برای افزایش خون بالا ممکن است رعایت رژیم غذایی، محدودیت مصرف نمک و کنترل وزن لازم باشد.
- درو را هر روز در وقت معین مصرف کنید.
- در صورت نیاز به عمل جراحی پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نماید.
- مصرف درو را بدون تجویز پزشک قطع ننمایید.
- همزمان با مصرف این دارو از مصرف داروهای دیگر بدون تجویز پزشک خودداری ننمایید.
- برای جلوگیری از بروز دهیدراسیون در صورت تهوع، استفراغ یا اسهال شدید و تداوم این علائم به پزشک مراجعه نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه گردد، لذا ضمن درمان از رندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.
- در صورت بروز علائم عفونت (مانند لرز، تب یا گلو درد) و یا علائم زردی (مانند زردی چشم ها یا پوست) به پزشک مراجعه نمایید.
- قبل از انجام تست های آزمایشگاهی در صورت مصرف کاپتوپریل پزشک معالج را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف درو بری هر بیمار را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازت اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت بروز هر کدام با پزشک خود مشورت کنید.

- عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:
- با شیوع کمتر: افت فشار خون (سرگیجه، سبکی سر، غش)، راش پوستی همراه با بدون خارش، تب یا درد مفاصل.
- نادر: تورم صورت، دستها یا پاها، اشکال در بلع یا تنفس، درد معده، درد شکم، درد قفسه سینه، علائم افزایش پتاسیم خون (آشفته گی، ضربان قلب نامنظم، عصبی شدن، بی حسی یا گزگز دست ها، پاها یا لبها، کوتاه شدن و یا اشکال در تنفس، ضعف و یا سنگینی پاها).
- عوارضی که در صورت تداوم یا ایجاد ناراحتی نیاز به توجه پزشکی دارند :
- شایع: سرفه خشک و مداوم، سر درد.
- با شیوع کمتر: اسهال، تهوع، اختلال در حس چشایی، خستگی غیر معمول.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است مگر به تشخیص پزشک متخصص.
مصرف این دارو در دوران شیر دهی توصیه نمی شود. مگر به تشخیص پزشک متخصص.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه شود.



شرکت داروسازی امین
ایران - اسفهان