

# فلوکونازول ۲۰۰

۲۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

**این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.**  
فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

## راهنمایهای عمومی و هشدارها :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت سابقه حساسیت به فلوکونازول و هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده یرنگی.
- در صورت سابقه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله نارسای کبدی، کلیوی، نارسای احتقانی قلب، ابتلا به طیف قلب و یا هر نوع آریتمی قلبی، اختلالات عروقی و اختلالات الکترولیت‌های خونی مانند سدیم و کلسیم.
- در صورت سابقه مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کولینرژیک، داروهای ضد دیابت خوراکی، بلوک کننده های کانال کلسیم، آنتی اسیدها، آنتاگونیستهای هیستامینی H2، ترفنادین، دیگوکسین، کلاریترومایسین، اریترومایسین، لووستاتین، سیموستاتین، امپرازول، سوکرافیت، سیزاپراید، ریفامپین، وارفارین و داروهای اعصاب و روان مانند پیموزاید و همچنین سابقه مصرف الکل.
- در صورت اختلال در عملکرد غدد آدرنال.
- در صورت سابقه واکنش های آلرژیک پوستی مانند خارش، قرمزی پوست و یا تنگی نفس.

در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نکنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.  
دوره درمان را کامل نمایید.

## مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید.

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.  
در صورت بروز عوارض زیر بلافاصله به پزشک خود مراجعه نمایید:

تب و لرز، تهوع، خستگی و ضعف، خونریزی، کاهش اشتها، زرد شدن چشمها یا پوست، ادرار تیره، مدفوع کم رنگ، بثورات جلدی، کپهر و خارش، ورم صورت، دستها یا پاها، اشکال در تنفس یا بلع.  
عوارضی که در صورت تداوم و یا مزاحمت لازم است به پزشک مراجعه نمایید:  
سردرد، سرگیجه، اسهال، درد معده و سوزش سردل.

## تداخلات دارویی :

فلوکونازول با داروهای زیر تداخل دارد، در صورت مصرف این داروها قبل از شروع مصرف فلوکونازول با پزشک خود مشورت نمایید:  
ترفنادین، ریفامپیسین، مشتقات فنانتیل، نورتریپتیلین، آمفتورسین - B، وریکونازول، وارفارین و هر نوع داروی ضد انعقاد، بنزدیازپین ها (الپرازلام، لورازپام، کلونازپام، اکسازپام)، کاربامازپین، فنی تونین، نیفیدین، آملودیپین، وراپامیل، لوزارتان، هیدروکلروتیازید، سیکلوسپورین، تاکرولیموس، سیکلوفامید، استاتین ها (آترواستاتین، لووستاتین، سیموستاتین)، سلکو کسب، ناپروکسن، ملوکسیکام، دیکلوفناک، ضد بارداری ها خوراکی، پردنیزولون، زیدوودین، گلی بن کلامید، گلی پیزاید، تیوفیلین، مکمل های حاوی ویتامین A و امیودارون.

## مصرف در بارداری و شیردهی :

برای مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی حتماً با پزشک متخصص مشورت نمایید.

## مسمومیت :

در صورت بروز مسمومیت بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

## روش آماده سازی :

- در بسته بندی اصلی دارو، یک ساشه حاوی بودر دارویی و یک حلال وجود دارد. جهت آماده سازی سوسپانسیون، ابتدا محتوای ساشه را درون شیشه حاوی حلال آماده بریزید، درپوش ظرف را محکم ببندید و ۲۰-۱۵ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات بودری به طور یکنواخت درحلال پخش شوند و یک سوسپانسیون یکنواخت به دست آید.
- قبل از هر بار مصرف، محلول آماده شده را ۱۰-۵ ثانیه تکان داده و پس از حصول سوسپانسیون یکنواخت مصرف نمایید.
- به منظور اندازه گیری حجم دقیق فرآورده، از سرنگ داخل جعبه استفاده نمایید و قبل از هر بار مصرف داخل و خارج سرنگ را بشویید.

## شرایط نگهداری :

- قبل از آماده سازی سوسپانسیون، حلال و ساشه حاوی دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- بعد از آماده سازی، سوسپانسیون را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- پس از آماده سازی، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن بایستی دور ریخته شود.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



شرکت داروسازی امین  
ایران - اصفهان

