

# سیروز مایید ۴۰

## فُوروز مایید

محلول خورایی

هر ۵ میلی لیتر حاوی: فُوروز مایید ۴۰ میلی گرم

**این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید**

### هشدارها:

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
  - در صورت حساسیت به فُوروز مایید یا هر نوع ماده دارویی، اسانس و رنگ.
  - در صورت سابقه حساسیت به سولفانامیدها و یا مشتقات آنها مثل سولفادiazین یا کوتریماکسازول.
  - در صورت از دست دادن خون یا دهیدراتاسیون و پائین بودن غلظت سدیم یا پتاسیم خون.
  - در صورت سابقه بیماری های کبدی مانند سیروز، بیماری های حاد یا مزمن کلیوی، بیماری آدیسون، بیماری یورفیری.
  - در صورت ابتلا به بیماری های پتیر تروفی خوش خیم پروستات، دیابت، نقرس و سطح پائین پروتئین خون.
  - در صورت مصرف داروهای پائین آورنده فشار خون، بیماری ها یا سایر شرایط پزشکی که می تواند باعث افت فشار خون شود.
  - در صورت احساس گیجی یا ابتلا به بیماری هایی که با اسهال و استفراغ یا عدم میل به غذا خوردن و نوشیدن همراه می شوند.
  - در صورت سطح بالای کلسیم در خون.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

فُوروز مایید از جفت عبور کرده، فلذا در صورت بارداری، شک به باردار بودن، و یا قبل از اقدام به بارداری پزشک را از اینکه تحت درمان با فُوروز مایید هستید مطلع نمایید. فُوروز مایید در زمان شیردهی نیاستی مصرف شود.

### توصیه ها:

**دوره درمان با این دارو را کامل کنید و از قطع مصرف به صورت ناگهانی و بدون دستور پزشک خودداری کنید.**

- در زمان مصرف فُوروز مایید پایش منظم سطح خون سدیم، پتاسیم، گلوکز، منیزیم، کلسیم، بی کربنات، کلراید و اوریک اسید و نیز نشانگرهای عملکرد کلیه مانند اوره، نیتروژن و کرانین خون توصیه می شود.
- فُوروز مایید می تواند باعث کاهش سطح هوشیاری شود، در زمان مصرف این دارو در رانندگی و انجام کارهای دقیق دقت ننماید.
- دستور مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می شود، اما بهتر است زمان مصرف آن صبح ها و با معده ی پر باشد.
- در صورت فراموشی مصرف یک دوز، به محض به یاد آمدن آن را مصرف ننمایید مگر آنکه به زمان مصرف دوز بعدی نزدیک شده باشید و هرگز در صورت فراموشی دوز بعدی را دو برابر ننمایید.
- در افراد مسن به علت احتمال بالاتر اختلالات عروقی و نیز عملکرد کلیوی ضعیف تر مصرف دارو با ایستی با احتیاط صورت پذیرد. در افراد مسن با عارضه ی فراموشی و مصرف کننده ی ریسپریدون این مورد بایستی بیشتر توجه گردد.
- در صورتی که قرار است بیمار تحت قرآ پندهای تشخیصی به صورت Radio contrast قرار گیرد پزشک را از مصرف همزمان فُوروز مایید آگاه نماید.
- به علت احتمال افت فشار خون وضعیتی با فُوروز مایید، در هنگام برخاستن از رختخواب یا حالت نشسته به آهستگی بلند شوید.

### تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

- داروهای مهارکننده گیرنده آنژیوتانسین (کاپتوپریل، انالاپریل) و لوآرتان، کاندازتان، ایریزارتان، والزارتان
- داروهای ضد ساینکوز مانند ضد افسردگی های سه حلقه ای (ایمی پرامین، کلومیپرامین، امی تریپتیلین، نور تریپتیلین)
- داروهای خواب آور و ضد اضطراب (پیموزید، فنوتیازین ها، دیسیریدون، لیتیموم کربنات، مهارکننده های مونو آمین اکسیداز (ترانیل سیپرومین، سلزلیین)
- داروهای آهنده ی فشار خون مثل بلوک کننده های کانال کلسیمی (املودیپین، نیفیدپین)، بتابلوکرها (متوپرولول، پروپرانولول، سوتالول)، کلونیدین، آمیودارون، دیویزیپرامید، فلکانیاید، ماینوکسیدیل، لیدوکائین، پرازوسین، دیازوکسید، متیل دوبا، هیدرالازین و داروهای نیتراتی (نیترو گلیسرین، ایزوسورباید دی نیترات)، گلیکوزید های قلبی (دیگوکسین)، داروهای ضد دیابت، داروهای ضد صرع (کاربامازپین، فنی توفین)

- آنتی بیوتیکهای آمینوگلیکوزیدی (جتنامایسین، وانکوماسین)، پلی میکسین، آمفوتریسین بی، تری متوپریم، سفالوسپورین ها (سفالکسین، سفتریاکسون) و داروهای ضد ویروس

- سوکرالفیت، کلرال هیدراته، امفتامین ها، اتوموکستین، استروئیدها، شیرین بیان، سیس پلایتین، متوترکسات، لوودوبا، سیکلوسپورین، تاکرولیموس، باکلوفن، تیزانیدین، قرص های ضد بارداری حاوی استروژن،

داروهای پروژسترونی، تیوفیلین، پروپنسید، بی حس کننده های عمومی و داروهای بیهوشی، داروهای ملین مانند سنا و بیزاکودیل.

- داروهای ضد آسم مانند سالیواتامول، تربوتالین، سالمترول، فورمتروپول و داروهای ضد احتقان بینی مانند افردرین و زایلومتازولین.

### مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می شود.

### عوارض جانبی:

- ۱- عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارند: واکنش های آلرژیک مانند خارش، راش پوستی، خونی زری گوارشی، تب، درد و التهاب مفاصل، التهاب چشم ها، خونریزی زیر پوستی، گلودرد، زخم های دهانی، مشاهده خون در ادرار، تپش قلب نامنظم، اختلال در شنوایی، تعداد غیرنرمال سدیم و پتاسیم خون و سلولهای خونی.
- ۲- عوارض جانبی خفیف که ممکن است ظرف چند روز برطرف شوند و در صورت استمرار نیاز به توجه پزشکی دارند: دو بینی، افت فشار خون، احساس سبکی در سر، سردرد، گیجی، خواب آلودگی، ضعف، حالت تهوع، اختلال در دید، خشکی دهان، حساسیت پوستی به نور، احساس فشار در سر، تشنگی، اسهال، یبوست، درد سینه، ضعف، تهوع، استفراغ، افت اشتها، افت فشار خون وضعیتی.