

پتاسیم کلراید ۲۰

محلول خوراکی

هر ۱۵ میلی لیتر حاوی پتاسیم کلراید ۲۰ میلی اکی والان

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.
مصرف این دارو بدون نسخه پزشک ممنوع است.

راهنمایی های عمومی و هشدارها:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری کلیوی و کبدی.

- تجویز این محلول در بیماران سالمند و مبتلا به سیروز کبدی باید ابتدا با دوز پایین صورت پذیرد و افزایش دوز تا محدوده ی درمانی باید تدریجی و با بررسی عملکرد کلیه و کبد اتفاق بیفتد.

- دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک تعیین می کند.

- دارو را به همراه آب یا آبمیوه خنک مصرف کنید.

- دارو را بلافاصله پس از غذا مصرف کنید.

عوارض جانبی:

- محلول پتاسیم کلراید می تواند منجر به تحریک گوارشی شود. رقیق سازی و مصرف دارو همراه غذا می تواند این تحریک را کاهش دهد.

- برخی دیگر از عوارض جانبی این دارو عبارت است از: حالت تهوع، استفراغ، نفخ، درد، ناراحتی شکمی و اسهال.

تداخلات دارویی:

این محلول با داروهای ضد فشار خون دیورتیک موثر بر پتاسیم (مانند اسپرونولاکتون، آمیلورید، اپلرنون)، داروهای ضد فشار خون مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین

یا ACEIs (مانند کاپتوپریل، انالاپریل، لیزینوپریل)، داروهای ضد فشار خون مسدود کننده رسپتور آنژیوتانسین (مانند لوزارتان، والزارتان، کاندزارتان، ایریزارتان) تداخل دارد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی بایستی با نظر پزشک صورت پذیرد.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از حد این محلول به صورت اتفاقی، در اسرع وقت به اولین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- پس از باز شدن در پوش محصول، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن باید دور ریخته شود.

- پس از هر بار مصرف، درب شیشه را محکم ببندید.

