

سیلد - آپ[®]

سیلدنافیل ۱۰۰

قرص روکشدار خط دار

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت سابقه حساسیت به سیلدنافیل یا هر نوع دارو / غذا / ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله بیماری های کبدی، کلیوی، بیماری های قلبی-عروقی، فشار خون، دیابت، کلسترول بالا و بیماری های خونریزی دهنده.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای مسدود کننده گیرنده آلفا مانند تامسولوسین، نیترات ها شامل نیترو گلیسرین، داروهای مهار کننده سیتوکروم ۴۵۰ مانند سایمتیدین، اریترومايسين، ایتراکونازول و کتوکونازول.
- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمائید و از مصرف این دارو بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمائید.

هشدارها :

- مصرف این دارو در زنان و کودکان ممنوع می باشد.
- اگر اثر دارو بیش از ۴ ساعت ادامه یافت بلافاصله به پزشک مراجعه نمائید.
- چنانچه مصرف این دارو باعث کاهش دید در یک یا هر دو چشم شد بلافاصله دارو را قطع کرده و به پزشک اطلاع دهید.
- این دارو را بطور همزمان با دیگر داروهایی که در درمان مشکلات نعوظ استفاده می شوند، مصرف ننمائید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانبی دارو :

عوارضی که در صورت بروز، نیاز به توجه پزشکی دارند : سرگیجه، سردرد، عفونت مجاری ادراری، خون در ادرار، خونریزی چشمی، دید غیر طبیعی، حساسیت به نور، بثورات پوستی، گر گرفتگی، درد در ناحیه سینه و قلب، سوء هاضمه، اسهال، خونریزی بینی، سینوزیت، احتقان بینی و اضطراب.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

بسته بندی :

سیلدنافیل ۱۰۰ به شکل قرص های گرد با روکش آبی رنگ در بلیستر ۱۰ عددی درون جعبه عرضه می شود.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.