

# استدیامین®

## پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی پرمیدون (۲۵۰ میلی‌گرم در ۵ میلی‌لیتر)

پرمیدون یا مکائسیم یا مکائسم های ناشناخته، آسانه تشنج الکتروشیمیایی یا شیمیایی را افزایش می دهد یا الگوهای تشنج را در حیوانات آزمایشی تغییر می دهد که منجر به اثرات ضد صرع این دارو می شود. پرمیدون مانند دو متابولیت آن یعنی فنوباریتال و فنیل اتیل مالون آمید (PEMA) دارای اثرات ضد تشنجی است.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

**ترکیب فرآورده:**

هر ۵ میلی لیتر سوسپانسیون حاوی ۲۵۰ میلی گرم پرمیدون می باشد.

**موارد مصرف:**

پرمیدون می تواند به تنهایی یا همزمان با سایر داروهای ضد تشنج حملات انواع صرع های **psychomotor.grand mal** , **focal epileptic seizures** را کنترل کند.

**مقدار و نحوه مصرف:**

مقدار و نحوه ی مصرف این فرآورده را پزشک تعیین می کند.

**نکات مهم و هشدارها:**

– قبل از مصرف پرمیدون در شرایط زیر یا پزشک یا داروساز مشورت کنید:

– در صورت حساسیت به پرمیدون یا متابولیت های آن مانند فنوباریتال یا هرنوع ماده دارویی ، رنگ یا ماده ی محافظ.

– در صورت سابقه ی ابتلا به بیماری های کبد و کلیه.

– در صورت ابتلا به بیماری پورفیری (**porphyria**)

– قطع ناگهانی داروهای این دارو ممکن است وضعیت تشنج را تسریع کند.

– شروع اثربخشی درمانی پرمیدون چند هفته طول می کشد لذا از قطع دارو به صورت خودسر و بدون نظر پزشک در چند هفته اول خودداری کنید.

– پرمیدون با مصرف الکل تداخل دارد.

– بیماران باید در مورد انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری ذهنی دارند (مانند کار با ماشین آلات و رانندگی) احتیاط کنند.

– در صورت بروز علائم و افکار خودکشی فوراً به پزشک اطلاع دهید.

– در بیماران مبتلا به افسردگی یا تمایل به خودکشی، بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی، نارسایی کبدی و کلیوی، هیپوآزنالیسم و بیماران با سابقه سو مصرف مواد مخدر با احتیاط مصرف شود.

– همیشه قبل از استفاده بطری را تکان دهید.

– در صورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری آن را مصرف نمایید مگر اینکه نزدیک به دوز بعدی باشدو از دوبرابر کردن دوز بعدی بپرهیزید.

**تداخلات دارویی:**

پرمیدون با روه های کاهنده اثر سینتروکروم **CYP3A4** مانند **clarithromycin, erythromycin, diltiazem, itraconazole, ketoconazole, ritonavir, verapamil** مانند **CYP3A4** تیز تداخل دارد.

**CYP3A4** مانند **Carbamazepin** , **phenytoin** , **rifampicin** , **phenobarbital** نیز تداخل دارد.

**غذایی:**

رژیم های غذایی با پروتئین پایین، مدت اثر پرمیدون را افزایش می دهند.

از مصرف همزمان گریپ فروت با پرمیدون پرهیز نمایید.

**بارداری و شیردهی:**

اثرات پرمیدون در بارداری و شیرخواران ناشناخته است و صرفاً با تجویز پزشک می توان استفاده کرد.

**مسمومیت:**

در صورت مصرف بیش از حد بلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

**عوارض جانبی:**

هر فرآورده ممکن است در برخی افراد باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود، درصورت بروز هر عارضه با پزشک مشورت نمایید.

پرمیدون ممکن است با شروع درمان، اثرات **CNS**، از جمله خوابالوگی، آرامبخشی، آناسکی، اختلال نیستاگموس و سرگیجه ایجاد کند. اثرات "دوز اول" **CNS** عمدتاً آرام بخش و نیستاگموس)

به دلیل ایجاد تحمل در عرض چند روز برطرف می شود.

عوارض جانبی دیگری مانند راش پوستی، دوبینی، اختلالات احساسی و عوارض خونی و مربوط به گلیول قرمز نیز ممکن است ایجاد شود.

**شرایط نگهداری:**

– در بسته بندی اصلی دارو یک ساشه حاوی پودر دارویی و یک حلال برای تهیه سوسپانسیون پرمیدون قرار داده شده است، ساشه و حلال را قبل از مصرف در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و

در جای خشک نگهداری نمایید، جهت آماده سازی محتوای ساشه را در شیشه حاوی حلال آماده بریزید و ۳۰-۱۵ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات پودری به طور یکپوخت

درحلال پخش شوند و یک سوسپانسیون زرد یکپوخت به دست آید.

ساشه و حلال را قبل از مصرف در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و در جای خشک نگهداری نمایید.

– سوسپانسیون آماده به مدت ۳۰ روز در دمای کمتر از ۳۰ درجه قابل نگهداری است.

– قبل از هر بار مصرف محلول آماده شده را ۱۰-۵ ثانیه تکان داده و پس از حصول سوسپانسیون زرد رنگ یکپوخت مصرف نمایید.

– سوسپانسیون آماده شده را از پنج زدگی محافظت نمایید و پس از ۳۰ روز از زمان باز شدن مقدار باقی مانده در شیشه را دور بریزید.

– دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

– دوره درمان خود را کامل نمایید.

– دارو را دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.



شرکت داروسازی ایران  
ایران - اسفهان

