

سیر و بیتال^{۱۵}

فنوباربیتال

الگریز خوارکی

هر ۵ میلی لیتر حاوی فنوباربیتال ۱۵ میلی گرم

ین درو بری بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در مورد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی :

- قبل از مصرف آین درو، در مورد زیور با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت ساقمه حساسیت به فنوباربیتال، هر گونه رنگ، سانس یا ماده جانبی.
- در صورت ساقمه بیماری های کبدی و کلیوی.
- در صورتی که در هر مرحله از درمان فکاری مثل تعامل به خودکشی یا آسیب زدن به خود در ذهن داشتید، بلافضله به پزشک مراجعه نمایید.

صرف در بارداری و شیردهی :

فنوباربیتال از جفت عبور کرده، فلاذ در دوران بارداری مصرف آن باید تحت نظر پزشک باشد، در صورت قدم به بارداری بلافضله به پزشک خود مشورت نمایید. مصرف آن در دوران شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها :

- در صرد کمی از بیماران مصرف کننده این درو، تکررت شبه خودکشی یا آسیب زدن به خود دیده می شود، اگر در هر مرحله از درمان چنین موردی مشاهده شد، سریعاً به پزشک مر جمهه نمایید.
- از آن جایی که بین دروغ دارند قابل توجهی کل درست، در زمان استفاده از آن در حموضه رنتنگی و کار با دستگاه و موردی که تباز در دقت درند، حتیات نمایید.
- در صورت مصرف افراد کلیک و باد روهای زیر پیش از شروع درمان با فنوباربیتال، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ضد نعفای خانه ای تر سیگار (پوپریوپیون)، آسیب دهنده ای از سایکلن ها، سغوتاکسین (کل فنیر آین، بروموترازین)، دروهای ضد ویروس، متورنیک، متورنید زول، متفیتیک، متورنید زول، متفیتیک، متورنید زول، متفیتیک ها، سغوتاکسین (کل فنیر آین، بروموترازین)، دروهای ضد ویروس، متورنیک، سیاستاراژامید و سایر دروهای ضد ضرع (یعنی توئین، امی تریپتیلین، فلوکستین، لیتیوم و ...). دروهای دیورتیک (فوجزامید، سیاستاراژامید) و سایر دروهای ضد ضرع (یعنی توئین، کاربامازین، سیدیم و لبروت، کلونازامین، پریمیدون، ...)، فولیک سید، دروهای ضد قارچ، دروهای قلبی و ضد آنین (بروپرتوول)، آملودپریدین، متورنید زول، دیگوکسین، دروهای هرمونی، دروهای ضد مالاریا، مکاتین، متافون، متابون، متل فنیدت، دروهای ضد سایکوز (مالوپریدول، کلرپروزان، ...)، لوتوتروکسین، پریدوکسین، ستابمیتوون، دروهای ضد سل و دروهای مخدّر.
- در صورت تعامل با تزریق و اکسن آنفلوآنزا قبل از تزریق، پزشک با دراوساز را از اینکه فنوباربیتال مصرف می کنید مطلع نمایید.
- فنوباربیتال با ماده گیاهی Hypericum perforatum (St John's-wort) با گل راعی که در برخی ترکیبات دارویی وجود دارد، داخل دارد. در صورت مصرف هر گونه داروی گیاهی، پزشک با دراوساز را مطلع نمایید.
- در ادویه فنوباربیتال می تواند روی سطح و تامینات D₉ K، اسید فولیک و هجهجنین فسفات و کلسیم خون تاثیرگذار باشد.
- در زمان مرگ این دارو، مصرف افغانی را محدود نمایید.
- در سالمندان با توجه به اختلال افت عملکرد کلیوی یا کبدی مصرف این دارو نیاز به تنظیم دوز توسط پزشک دارد.
- در برخی از کودکان و سالمندان متعاقب مصرف فنوباربیتال ممکن است بیمار به جای خواب آسودگی دچار تحریک بذری و آشفتگی شود.
- دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می شود.

عوارض جانبی :

- عوارضی که در صورت بروز نیاز به مر جمهه فوری به پزشک دارند:
- فکار خودکشی یا آسیب زدن به خود، تپ، راش و زردی پوست، رخم های دهان و پوست، خوبنیزی، پوسته شدید پوست، تورم غدد.
- عرض جانبی خیفی که ممکن است طرف چند روز بر طرف سوند و در صورت استمرار نیاز به توجه پزشکی درند:
- خوب آلوگر، قفت نریزی بدن، عدم تعادل در حرکت، خلال در حافظه، گیجی و عدم تمرکز، حالات فردگیر.
- سایر عروض: سر درد، بی خونی، سختی در تنفس، خارش پوست، حساسیت به نور، تغییرات خلق، گیجی.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بین زدگی محافظت نمایید.
- پس از باز شدن در پوش بطری، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن باید دور ریخته شود.