

اورسوغارد® ۲۵۰

اورسوداکسی کولیک اسید

۲۵۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

راهنمایی های عمومی و هشدارها :

- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سابقه ی حساسیت به این دارو، اسیدهای صفراوی یا هر نوع غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلا به بیماری های مزمن کبدی، التهاب و بیماری های مجاری صفراوی و کیسه صفرا، پانکراس و سنگ صفراوی.
- دارو را دقیقاً دستور پزشک مصرف نمایید.
- برای بررسی پیشرفت درمان به صورت مداوم با پزشک مراجعه نمایید.
- دوره درمان را کامل نمایید.
- دارو را حتی در صورت احساس بهبودی بدون تجویز پزشک قطع ننمایید.
- بهتر است این دارو را هنگام عصر و یا قبل از خواب مصرف نمایید.
- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- درصورت بروز علائمی مانند سوء هاضمه، درد معده، تهوع و استفراغ شدید سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت مصرف داروهای کاهنده سطح کلسترول خون (کلوفیرات، فنوفیرات) و نیز داروهای حاوی استروژن و در صورت مصرف داروی سیکلوسپورین حتماً قبل از شروع مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- در ۳ ماهه ابتدایی مصرف این دارو پزشک بایستی عملکرد کبدی بیمار را به طور منظم (هر ۴ هفته یکبار) بررسی نماید و پس از سه ماهه این بررسی به صورت هر ۳ ماه یکبار ادامه پیدا کند.
- در صورت نیاز به مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم بایستی بین مصرف این دارو و آنتی اسید ۲ ساعت فاصله باشد.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، لیکن در صورت بروز هر یک از موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید: حساسیت، عفونت مجاری ادراری، آرتریت، درد پشت، لکوپنی، زخم معده، ریزش مو، اسهال، یبوست، استفراغ، درد عضلانی و مفاصل، گلودرد، سرفه و آبریزش بینی.

تداخلات دارویی :

مصرف این دارو می تواند باعث تغییر شدت و یا کاهش عملکرد داروهای زیر شود: کلستیرامین، کلستینیل، آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم، سیروفلوکساسین، داپسون، سیکلوسپورین، رزرواستاتین

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود، مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

روش آماده سازی:

- در بسته بندی اصلی دارو، یک ساشه حاوی پودر دارویی و یک حلال وجود دارد. جهت آماده سازی سوسپانسیون، ابتدا محتوای ساشه را درون شیشه حاوی حلال آماده بریزید و ۳۰-۱۵ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات پودری به طور یکنواخت درحلال پخش شوند و یک سوسپانسیون یکنواخت به دست آید.
- قبل از هر بار مصرف، محلول آماده شده را ۱۰-۵ ثانیه تکان داده و پس از حصول سوسپانسیون یکنواخت مصرف نمایید.
- به منظور اندازه گیری حجم دقیق فرآورده، از سرنگ داخل جعبه استفاده نمایید و قبل از هر بار مصرف داخل و خارج سرنگ را بشوید.

شرایط نگهداری:

- قبل از آماده سازی سوسپانسیون، حلال و ساشه حاوی دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- بعد از آماده سازی، سوسپانسیون را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- پس از آماده سازی، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن بایستی دور ریخته شود.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



شرکت داروسازی امین
ایران - اسفهان

