

# بروپین<sup>®</sup> ۴۰

ایبوپروفن

قطره خوراکی

۴۰ میلی گرم در میلی لیتر

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورت سابقه حساسیت به ایبوپروفن و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به هر نوع بیماری از جمله سابقه خونریزی گوارشی، زخم معده، آسم، بیماری های قلبی-عروقی، نارسایی های کلیوی و کبدی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله استامینوفن، آسپرین، سایر داروهای ضد درد و ضد التهاب، داروهای ضد انعقاد خون، داروهای کاهنده فشار خون، پائین آورنده قند خون، فرآورده های حاوی الکل، والپروئیک اسید، سیکلوسپورین، لیتیم، متوترکسات و پروپنسید.

## مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

## هشدارها :

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمائید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری نمائید.

- این دارو در صورت سابقه واکنش آلرژیک شدید از قبیل آنافیلاکسی یا آنژیوادم ناشی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی منع مصرف دارد.

- از مصرف همزمان این دارو با فرآورده های حاوی الکل خودداری نمائید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه یا خواب آلودگی گردد.

- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمودید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت چشم پوشی کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دوبرابر نکنید.

- در صورت بروز علائم ادم، زخم یا خونریزی گوارشی، ناراحتی قلبی-عروقی، افزایش وزن یا بیورات پوستی سریعاً به پزشک اطلاع دهید.

- از مصرف همزمان استامینوفن و آسپرین با ایبوپروفن مگر با تجویز پزشک خودداری کنید.

- از مصرف دو یا چند داروی ضد التهاب غیر استروئیدی بطور همزمان مگر با تجویز پزشک خودداری نمائید.

- ایمنی و اثر بخشی این دارو در نوزادان تا ۶ ماه به اثبات نرسیده است.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

## مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو بصورت زیر می باشد.

**به عنوان ضد تب، در کودکان ۶ ماه تا ۱۲ سال:**

۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن جهت تب کمتر از ۳۹/۱۷ درجه سانتیگراد و ۱۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن برای تب های بالاتر مصرف می شود. مقدار مصرف در صورت نیاز هر ۶-۴ ساعت می تواند تکرار شود.

حداکثر مقدار مصرف روزانه ایبوپروفن برای کودکان ۴۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن است.

**به عنوان ضد التهاب، در کودکان ۶ ماه تا ۱۲ سال :**

ابتدا روزانه ۴۰-۳۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در سه یا چهار مقدار منقسم مصرف می شود. پس از پاسخ رضایت بخش بدست آمده، مقدار مصرف باید تا پائین ترین مقدار جهت کنترل علائم کاهش داده شود.

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتند، لیکن در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک خود مشورت کنید: واکنش های آلرژیک، بیورات پوستی، کبهر یا خارش، زرد شدن پوست یا چشم ها، ادم، اشکال در تنفس، زنگ زدن یا همهچه در گوش، سر درد، سرگیجه، خواب آلودگی، عصبانیت و ناراحتی های گوارشی نظیر تهوع یا استفراغ، اسهال، بیوسیت و درد معده.

## مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه شود.

## شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.