

## لوتیرامین

### لوتیراستام

محلول خوراکی (۵۰۰ میلی گرم / ۵ میلی لیتر)

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید

#### : راهنمایبهای عمومی

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید

– در صورت سابقه حساسیت به لوتیراستام و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی –

– در صورت مصرف هر نوع دارو –

– در صورت ابتلابه هر نوع بیماری از جمله نارسایی کلیوی –

#### : مصرف در بارداری و شیردهی

–مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود

#### هشدارها :

– دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیشتر یا کمتر از حد توصیه شده توسط پزشک خودداری نمائید.

– هنگام مصرف این دارو بطور منظم به پزشک مراجعه کنید.

– بدون مشورت با پزشک داروی خود را قطع نکنید.

– در صورت ضرورت قطع مصرف دارو، به منظور پیشگیری از افزایش تعداد حملات تشنجی، لوتیراستام باید به صورت تدریجی قطع شود.

– چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید با پزشک خود تماس بگیرید. از مصرف دوز دو برابر دارو جهت جبران دوز فراموش شده خودداری کنید.

– مصــــرف این دارو ممکن است باعث گیجی یا خواب آلودگی گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمائید.

– هر گونه تغییر در خلق و خوی و یا بروز رفتارهای تهاجمی، بی قراری و آشفتگی را سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

– قبل از هر عمل جراحی به پزشک یا دندانپزشک خود اطلاع دهید.

– ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان زیر ۴ سال ثابت نشده است.

#### مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند.

#### عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

مشکلات تعادلی، دوبینی، تب یا لرز، سرفه یا گرفتگی صدا، کمر درد یا درد پهلو، اشکال در دفع ادرار، علائم سینوزیت، گرفتگی یا آبریزش بینی، تنگی نفس، خس خس سینه، درد یا ضعف عضلانی، سر درد، سر گیجه، گلو درد، خواب آلودگی، تورم غدد گردن، اشکال در بلع، کاهش اشتها، کاهش وزن، سوزش، خارش، علائم رینیت و تغییرات خلق و خوی شامل بی قراری، فراموشی، اضطراب، افسردگی و عصبی بودن.

#### مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.

#### شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.



شرکت داروسازی امین

ایران – اصفهان