متفورمیــن

قرص روکشدار ۱۰۰۰ میلی گرمی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمائید.

راهنمائی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

- در صورت سابقه حساسیت به متفورمین و یا هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ
- در صورت ابتلا به بیماریهای نظیر ناراحتی های قلبی-عروقی، بیماریهای کبدی و کلیوی، لاکتیک اسیدوز، کتو اسیدوز، سوختگی شدید، اسهال شدید، تب بالا، عفونت شدید، جراحی، استرس شدید، تهوع، اختلالات گوارشی، پرکاری یا کم کاری غده فوق کلیوی، پر کاری یا کم کاری تیروئید یا غده هیپوفیز، سوء تغذیه، ضعف جسمانی و شرایطی که می تواند بر روی میزان قند خون تأثیر بگذارد.
- در صورت مصرف هر گونه دارو از جمله سایمتیدین، آمیلوراید و داروهای بلوک کننده کانال های کلسیم مانند دیگوکسین، مرفین، پروکائین اسید، کینیدین، کینین، رانیتیدین، تریامترن، تریامتوپریم، وانکومایسین و فورزماید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری منع مصرف دارد مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

هشدارها:

- دارو را مطابق دستور پزشک خود مصرف کنید.
- دارو را همراه یا بعد از غذا میل نمائید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف نمائید ولی اگر به زمان مصرف بعدی زمان زیادی باقی نمانده است مطابق برنامه معمول عمل کنید و از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری نمائید.
- جهت کنترل بیماری و تنظیم دوز دارو قند خون و کتون ادرار را مرتباً آزمایش نمائید.
- در صورتیکه پزشک دستوراتی در زمینه رژیم غذایی و ورزش داده باشد پیروی از این دستورات جهت کنترل بیماری و تنظیم دوز دارو بسیار مهم می باشد.

- مراقب علائم کاهش قند خون باشید این علائم شامل اضطراب، تغییرات رفتاری، تاری دید، عرق سرد، سردی پوست، اشکال در تمرکز، گرسنگی بیش ازحد، تندی ضربان قلب، سر درد، تهوع، عصبانیت و لرزش می باشد.
- از مصرف الکل و نوشابه های الکلی پرهیز نمائید.

- مراقب علائم افزایش قند خون باشید و در صورت بروز آن به پزشک مراجعه نمائید. این علائم شامل تشنگی بیش از حد، خستگی، درد معده ، تهوع و استفراغ، کاهش اشتها، تکرر ادرار، خشکی دهان، خواب آلودگی و تاری دید و نیز علائم کتو اسیدوز شامل استشمام بوی خاص میوه از دهان، خشکی و قرمزی پوست و تنفس سریع و عمیق می باشد.
- قبل از اقدام به هر عمل جراحی مصرف این دارو را به پزشک مربوطه اطلاع دهید.
- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان زیر ۱۰ سال ثابت نشده است.

مقدار و نحوهٔ مصرف:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمائید.

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله به پزشک خود مراجعه نمائید:

- علائم لاکتیک اسیدوز شامل اسهال، تنفس کوتاه و تند، خستگی، ضعف و خواب آلودگی غیر عادی، درد و کرامپ عضلانی.
- علائم کاهش قند خون شامل اضطراب، تغییرات رفتاری، تاری دید، عرق سرد، سردی پوست، اشکال در تمرکز، گرسنگی بیش ازحد، تندی ضربان قلب، سر درد، تهوع، عصبانیت، لرزش.

عوارضی که در صورت تداوم و ایجاد ناراحتی باید به پزشک مراجعه شود:

کاهش اشتهاء، درد معده، نفخ، سر درد، طعم فلزی در دهان، تهوع و کاهش وزن

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

شرکت داروسازی امین
ایران - اصفهان