

# سیلدنافیل ۵۰

سیلدنافیل (به صورت سیترات)

**این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.**

فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است.

## راهنمایی های عمومی و هشدار ها :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به سیلدنافیل، تادالافیل و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری خصوصاً سابقه بیماری شدید تا متوسط کلیوی و کبدی.
- دوره درمان با این دارو را کامل کنید و هرگز مقدار کمتر و یا بیشتر از میزان تجویز شده استفاده نکنید.
- این دارو می تواند همراه غذا و یا به تنهایی مصرف گردد، در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن دارو را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید. همچنین مصرف دارو را به طور خودسرانه و بدون مشورت با پزشک قطع نکنید.
- با توجه به اینکه سیلدنافیل ممکن است موجب گیجی و اختلال در بینایی شود، هنگام کار و رانندگی با احتیاط مصرف شود.
- برای کاهش سرگیجه، پس از مصرف دارو از بلند شدن ناگهانی خودداری نمایید.
- از مصرف این دارو همزمان با **گیب قیوت** و **الکل** خودداری نمایید.
- در صورت وجود و یا سابقه مشکلات زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
- سابقه سکته، مشکلات کبدی، فشار خون بسیار پایین، مشکلات ریوی و عروق ریوی، مشکلات قلبی شدید، از دست دادن مایعات بدن به مقدار زیاد، بیماری رتینی پیگمنتوزا، مشکلات مربوط به سولول های خونی، وجود خونریزی، زخم های گوارشی، شکل غیر عادی و یا اختلال عملکردی آلت تناسلی.
- به نظر می رسد که افراد سالمند به عوارض جانبی این دارو حساس تر هستند در نتیجه بهتر است برای هر کاربرد دارویی در این افراد، درمان با حداقل دوز ممکن شروع شود.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید.

عوارض جانبی :

عوارضی که در صورت بروز باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود:

- اختلال یا از دست دادن بینایی به طور ناگهانی، نمود بیشتر از ۴ ساعت همراه با درد شدید، اختلال شنوایی، کاهش شدید فشار خون

سایر عوارض:

سردرد، گرگرفتگی، سوء هاضمه، اسهال، احساس درد در بازو و پا، درد معده، پرمونی، درد قفسه سینه، نارسی قلب، غش کردن، عفونت تنفسی، برونشیت، علائم شبه آنفولانزا، عفونت مجاری ادراری و دندان، عفونت ویروسی دستگاه گوارش، واکنش های ناشی از حساسیت، تب، تهوع، کاهش گلبول قرمز، اضطراب، میگرن، اختلال در خواب، خستگی، خونریزی از بینی، سرفه، ریزش مو، خشکی دهان، اختلال در تنفس.

**تداخلات دارویی :**

- از مصرف همزمان این دارو با داروهای که حاوی نیترات و یا نیتریک اکساید هستند، مانند آمیل نیترات، ایزوسورباید مونونیترات، نیتروگلیسرین و همچنین داروهای مورد استفاده در عفونت های قارچی مانند کنوکنازول یا ایتراکونازول، داپوکستین، ریتوناویر و داروی ریبوسیلوات خودداری نمایید.
- در صورت مصرف داروهای زیر پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید:
- داروهای مهار کننده گیرنده آلفا (پرازوسین، ترازوسین، ...)، اترترومایسین، کلاریترومایسین، داروهای رقیق کننده خون (مثل وارفارین)، داروهای مورد استفاده در فشار خون ریوی، داروهای القا کننده سندروم استیون جانسون (کاربامازپین، فنی توفین، فنوباریتال، ...)، ساکوئیناویر، نفازودون.

مصرف در بارداری و شیردهی :

بارداری: این دارو از جفت رد می شود و جز در موارد بسیار ضروری نباید در دوران بارداری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین توصیه می شود افرادی که مصرف کننده این دارو هستند از بارداری خودداری نمایند.

شیردهی: این دارو با غلظت بسیار کم در شیر ترشح می شود. به نظر می رسد مصرف دارو در دوران شیردهی معنایی نداشته باشد، اما با توجه به محدود بودن مطالعات، در صورت نیاز به مصرف دارو حتماً با پزشک مربوطه مشورت نمایید.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را هر چه سریع تر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

روش آماده سازی :

- در بسته بندی اصلی دارو، یک ساشه حاوی پودر دارویی و یک حلال وجود دارد. جهت آماده سازی سوسپانسیون، ابتدا محتوی حاوی ساشه را درون شیشه حاوی حلال آماده ساز پریزید و ۱۵-۳۰ ثانیه به شدت تکان دهید، طوری که تمامی ذرات پودری به طور یکنواخت در حلال پخش شوند و یک سوسپانسیون یکنواخت به دست آید.

- قبل از هر بار مصرف محلول آماده شده را ۱۰-۵ ثانیه تکان داده و پس از حصول سوسپانسیون یکنواخت مصرف نمایید.

- به منظور اندازه گیری حجم دقیق فرآورده، از سرنگ داخل جعبه استفاده نمائید و قبل از هر بار مصرف داخل و خارج سرنگ را بشویید.

شرایط نگهداری :

- دارو را قبل و بعد از آماده سازی، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.

- پس از آماده سازی، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل نگهداری و مصرف می باشد و پس از آن باید دور ریخته شود.



شرکت داروسازی امین  
ایران-اصفهان

